

Tralialic[®]

Tramadol

Seguridad y analgesia efectiva para todos¹⁻⁴

Manejo racional de opioides

Estrategia: Escala analgésica de la OMS

La escala analgésica de la OMS tiene como objetivo **proponer una estrategia racional del incremento en la potencia analgésica** (analgésicos puros y adyuvantes) en función de la **intensidad del dolor y de la respuesta a las fases de tratamiento previas**.^{5,6}




Con esta escala se puede obtener un buen control del dolor en >80% de los casos.^{5,6}

Trallic®

Tramadol

Seguridad y analgesia efectiva para todos¹⁻⁴

- ▶ Analgésico opioide de acción central indicado en dolor moderado-severo, **AGUDO** y **CRÓNICO**.⁷
- ▶ Más de 20 años de experiencia clínica.⁸
- ▶ Fácil dosificación y tan eficaz como la vía parenteral.^{7,9}



Dosis.⁷

1 - 2 mg/kg/dosis
40 gotas=100 mg tramadol
Concentración similar a cápsulas
50-100 mg cada 6 a 8 hrs.



**A partir de 50 kg son 20 gotas o dosis respuesta del paciente.*

La solución para una exacta titulación.⁷

Material para uso exclusivo del representante médico.



Referencias: 1. Ali S., Sofi K., Qayoom Dar A. Comparison of Intravenous Infusion of Tramadol Alone with Combination of Tramadol and Paracetamol for Postoperative Pain after Major Abdominal Surgery in Children. *Anesthesia: Essays and Researches*. 2017; 11(2): 472-476. 2. Hernández-Palacios J., Moyao-García D., Ramírez-Mora J. Efectividad y efectos secundarios del tramadol y la nalbuphina en infusión para analgesia postoperatoria. *Anestesia en pediatría*. 2007; 30(1): S329-S334. 3. Sáez López M., Hernández S., et al. Tratamiento del dolor en el anciano: opiáceos y adyuvantes. *Rev Soc Esp Dolor*. 2016; 23(2): 93-104. 4. Ibañez S., et al. Terapéutica: tratamiento del dolor. *Formación continuada para farmacéuticos de hospital*. 117-152. 5. Guardia Serecigni J., et al. Guía de consenso para el buen uso de analgésicos opiáceos. > Gestión de riesgos y beneficios. *Sociodrogalcohol*. Edita: Sociodrogalcohol Valencia. 2017; ISBN: 978-84-945737-4-3: 1-180. 6. Puebla Díaz F. Tipos de dolor y escala terapéutica de la O.M.S. *Dolor Iatrogénico*. *Oncología*, 2005; 28 (3):139-143. 7. Información sustraída de la IPP Trallic. 8. Parra G., et al. Uso de tramadol como analgesia postoperatoria en cesárea. *Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas*. 2005; 10 (2): 50-54. 9. Bonilla P., et al. Uso de Opiáceos en tratamiento del DOLOR. *Manual para Latinoamérica*. 2011: 1-112.